

鋇劑灌腸

一、何謂鋇劑灌腸？

這項檢查需在放射科進行，首先由肛門灌入一白色液體(即鋇劑)，使整個大腸內充滿鋇劑，然後在 X 光下觀察與攝影。

二、目的：

檢查下腸胃道的形狀、功能及有無疾病，如結腸、直腸息肉、腫瘤或發炎、狹窄、潰瘍及腸蠕動情形。

三、檢查前如何準備？

1. 由醫護人員解釋並說明檢查目的及過程，並填寫檢查同意書。
2. 檢查前一天依醫囑口服瀉劑，同時飲用開水 2000-3000cc，以排空腸道。
3. 檢查前一晚午夜 12 時，至檢查前應禁食(包括水、藥物、口香糖)。
4. 檢查當天早上或前一晚，需接受清潔灌腸(若病人服用軟便劑後，仍未解便，則視情況給予灌腸)。

四、檢查後應注意事項：

1. 檢查結束後即可進食，應喝大量開水，幫助腸道內的鋇劑排出。
2. 檢查後 2-3 天的大便會呈現灰白或較淡色，請勿驚慌，並多喝水，以利鋇劑排出，這是檢查後正常情形。
3. 若檢查後出現便秘或解不出大便，請轉告醫護人員，視情形由醫師評估是否需給予使用輕瀉劑或灌腸。

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康

如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機