

內視鏡逆行性胰膽肝管攝影檢查

內視鏡逆行性胰膽肝管攝影檢查，係由口腔放入一管狀纖維內視鏡，經食道至胃、十二指腸、膽管、肝管、胰管，注入顯影劑後施行 X 光攝影，評估壺腹部、膽道及胰臟病變，並且做進一步的治療及處置，如：取結石、放置引流管等。

一、檢查目的：

可瞭解膽囊、膽囊管、肝管或胰臟方面的疾病，並可協助醫師診斷。

二、適應症：

1. 阻塞性黃疸，包括膽道狹窄、膽道結石。
2. 膽管炎、膽胰管狹窄、結石、滲漏、膽胰性腹痛。
3. 慢性胰臟炎反覆發作之腹部疼痛，且伴有胰管結石、胰管狹窄或偽囊腫者。
4. 其他影像檢查結果懷疑膽管或胰臟有異常時。
5. 膽道手術後對膽胰管狹窄、殘留結石、膽胰液滲漏之評估。

三、檢查前準備：

1. 需先填寫檢查同意書。
2. 檢查前須禁食 6-8 小時，包括水與食物。
3. 檢查前須先排空膀胱，並把活動假牙摘下，去除口紅、指甲油，取下眼鏡及身上金屬物品。
4. 檢查時會先給予局部麻醉劑及止痛劑，減輕不適。
5. 左側臥於檢查台上，頭向左側配合醫護人員，做深呼吸及吞嚥動作，以利管子放入，檢查中有噁心、想吐是正常的。
6. 檢查過程中，請聽醫師指示採不同姿勢、側睡、平躺、俯臥，檢查完畢即可返回病房，整個檢查約需 1~2 小時。

四、檢查後注意事項：

1. 檢查後一小時內暫勿進食，待麻醉藥作用消失之後，先試喝開水，若無噁到或嘔吐情形，就可恢復進食。
2. 注意是否有發紺、臉部潮紅、呼吸困難情形，如有上述情形立即告知醫護人員。
3. 因檢查過程會影響腸蠕動，加上麻醉藥物使用，易有腹脹情形，應多下床活動以利排氣。
4. 注意有無腹痛（尤其是右上腹部）、發燒，如有應告知醫護人員。

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康
如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機