

透析病人常用藥物及其注意事項

一、透析病人按時服用藥物是必要的，因其可藉由藥物來維持身體功能正常運作，預防其合併症，因此透析病人要了解正確服用藥物及注意事項是非常重要的。

二、透析病人常用藥物及使用注意事項：

藥名	作用	注意事項
降壓藥	調整血壓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透析時容易血壓下降，需與醫師討論於透析前是否暫停服用降血壓藥物。 2. 姿位改變時，有時會引起血壓降低，故改變姿勢、變換動作宜緩慢。 3. 每日宜定時測量血壓作為醫師參考及藥物調整之用。 4. 有心跳過快、過慢或咳嗽等不適症狀，可能為藥物副作用，應主動告訴醫師。
綜合維生素	補充維他命 B、C	透析時水溶性維生素 B 群及維生素 C 易流失，醫師依情況補充複合維生素。
葉酸 (Folic Acid)	治療貧血	幫助身體中蛋白質及氨基酸的利用，有消化性潰瘍時，暫停使用。
鈣片： 1. CaCO ₃ (碳酸鈣)需嚼碎 2. Capho(醋酸鈣)不要嚼碎	治療低血鈣和高血磷症	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照醫師指示服用。 2. 若用於治療高血磷症，須與食物一同服用，以減少磷的吸收。 3. 若用於治療低血鈣，請於飯前或飯後 1 小時服用，促進鈣吸收。
紅血球生成素 (EPO)	矯正貧血	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照血紅素數值變化予調整劑量。 2. 依照醫囑使用靜脈注射或皮下注射，以達到療效。
降血鉀藥物 (Kayexalate、Kalimate)	降血鉀	容易引起便秘，服用後應注意有無排便
胃乳片 Aluge(氫氧化鋁) Weil	磷結合劑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 降低血中的磷，預防副甲狀腺功能亢進引起的骨病變。 2. 於用餐中咬碎或磨粉後與食物拌勻一起服用。 3. 容易便秘，長期服用易有鋁中毒現象。
維生素 D3	抑制副甲狀腺功能	透析前晚睡前空腹服用，促進腸道吸收鈣，治療副甲狀腺功能亢進。
鐵劑	治療鐵性貧血	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照醫師指示使用，需經鐵質過敏試驗，陰性反應才能使用。 2. 發癢不適者，需立即停用。
磷能解	磷結合劑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用於控制接受透析治療的成年慢性腎病患者的高磷血症。 2. 常見副作用是腸胃道的不適反應。

國軍左營總醫院護理部 關心您的健康

如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機 2255