


中央靜脈導管置放術衛教指導

一、簡介：

中央靜脈導管是放置於大靜脈中的靜脈管路，常用來置入中心靜脈導管之大靜脈包括有：內頸靜脈、鎖骨下靜脈、股靜脈等。亦有從手臂周邊置入之中央靜脈導管(PICC)。



二、施打目的：

- (一) 作為較長時間之點滴注射及靜脈注射藥物血管通路。
- (二) 作為較高濃度靜脈營養液血管通路，**避免周邊血管疼痛及發炎。**
- (三) 可以測量中心靜脈壓力，提供醫護人員體液容積的參考。

三、何者不適合放置導管：


對特定材質或藥物有過敏病史者、有血液凝固異常或病變之病人。

四、常見合併症：

- (一) 中心靜脈導管置放時常見的併發症包括**局部血腫**、氣胸、血胸、血栓，發生率均不高，但是若病人有凝血功能障礙，則相對發生風險較高。
- (二) **感染**是中心靜脈導管留置後最常見的併發症，醫護團隊均會每天以無菌技術照護，評估病情是否可移除中心靜脈導管，且避免感染發生。

五、注意事項及照護：

- (一) **此管路置放後切勿自行拔除，會造成大量出血甚至死亡。**
- (二) **病人可能對身上的管路感到不適、反抗或無法了解其重要性，若評估病人意識混亂，可能自行拔除，必要時會予以約束。**
- (三) **照護陪伴之家屬也須注意病人是否有類似想法及不滿，因病人多於半夜自拔管路，應告知護理人員，我們將給予衛教及溝通並加以防範。**
- (四) **此管路以透明防水貼膜固定，不可淋浴，僅能擦澡，並且須留意病人點滴，翻身時可能拉扯到管路導致管路移位或滑脫。**



國軍左營總醫院護理部 關心您的健康