


心包膜積水引流術衛教指導

一、為什麼要接受心包膜積水引流術：


「心包膜」是包在與心臟外的一個膜狀組織，當中有著少許的液體做為潤滑，當這些液體異常的增加，便稱為心包膜積水。當積水的速度過快或是太多，會嚴重影響心臟收縮與舒張的功能，可能引起胸痛、胸悶、呼吸急促、呼吸困難、疲憊、頸靜脈怒張等症狀，須立即就診。



臨床多以心電圖、胸腔X光、心臟超音波作為積水確診依據。此時視病情嚴重度，醫師將使用內科藥物治療、安排穿刺檢查或外科手術引流積水。

二、心包膜腔積水引流術目的：

- (一) 抽取心包膜內的液體，改善心包膜積水造成的心包填塞。
- (二) 檢驗心包膜積水的成份、性質或做細菌與病毒的培養，提供心包膜積水原因的診斷。



三、合併症(約 1.6%)：

- (一) 輕度的心律不整。
- (二) 心包膜積血(因心臟穿孔)
- (三) 氣、血胸
- (四) 穿刺部位細菌感染。
- (五) 休克

四、引流術後注意事項及照護(病人及家屬)：

- (一) 有關於管路照護、紀錄引流液體、引流量、生命徵象、血氧、尿量監測等由醫護人員執行，病人及家屬應協助注意之。
- (二) 管路不可移動，引流袋應低於穿刺部位，以免引流液倒流引起感染。
- (三) 隨時注意穿刺部位有無紅腫、壓痛。仔細觀察敷料有無滲濕、引流管是否通暢、有無滑脫、扭曲、阻塞等情形。
- (四) 若發現有胸悶、胸痛、冒冷汗、心悸、出血等應立即告知護理人員。
- (五) 拔除引流管後若無出血或滲出液，一般情況傷口會自行癒合，保持傷口乾燥即可。拔管後 48 小時內禁止沐浴，擦澡也應避開穿刺部位。

國軍左營總醫院護理部 關心您的健康