

卡介苗預防接種之注意事項

接種卡介苗可預防肺結核，一般出生滿五個月後即可接種，若有特殊狀況可暫緩接種，例如：發高燒、出生時患有其他嚴重先天性疾病、嚴重複合型免疫缺乏症，需等狀況改善後再接種，接種卡介苗是安全的。

一、接種後之正常反應

卡介苗接種後 7~14 天，注射部位會呈現一小紅結節，之後逐漸增大，會有輕微痛癢情形，但不會發燒。4~6 週會變成膿疱或潰爛，此為正常反應，不要將膿疱擠破，不必擦藥或包紮，平均 2~3 個月會自行癒合結痂，留有一個小小疤痕。

嬰兒有時同側腋窩淋巴腺稍腫大，請不要緊張，以局部小小的膿疱來換取全身對結核病的抵抗力是值得的。

二、注意事項：

1. 接種卡介苗後，接種部位不可揉搓。
2. 接種 1 小時內不能洗澡，注射部位保持乾燥。
3. 接種卡介苗後不會發燒，若有發燒可能是其他原因導致，請就醫診治。
4. 卡介苗屬活菌，不可與活菌疫苗同時接種，如小兒麻痺口服疫苗、德國麻疹疫苗、黃熱病疫苗、MMR 三合一疫苗(腮腺炎、麻疹疫苗、德國麻疹等，需間隔一個月；其餘死菌疫苗皆可以在不同部位同時接種。
5. 卡介苗接種三個月後若沒有潰爛現象時，可做結核菌素測驗判定是否需要再重新接種。
6. 注射部位潰爛時，可用無菌棉球或紗布擦拭，不可擠壓、擦藥或包紮，保持乾燥清潔即可。

國軍左營總醫院護理部 關心您的健康

如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機 2323