

兒科靜脈注射注意事項

一、靜脈注射之目的：

- 1.孩子因發燒、拉肚子時，點滴可補充水份，維持電解質的平衡。
- 2.孩子因食慾不佳，點滴溶液內含適量的葡萄糖，可補充熱量。
- 3.醫師會視病情需要給予抗生素，經由點滴管路加藥來治療疾病。

二、注意事項：

- 1.點滴請維持一定高度，以防壓力不足，造成點滴不滴或管路回血而阻塞。故當您抱高孩子時，請注意點滴是否順暢。
- 2.當孩子有拉扯點滴的舉動時，請家屬能給予制止及安撫；注射於關節處時，請勿彎曲該關節。
- 3.打上點滴後仍可更換衣物，如有需要可請護理師協助。
- 4.如點滴管路掉落時，請立即找護理師幫忙，不要自行將點滴管路插回瓶中，避免造成感染。
- 5.注射部位有紅、腫、熱、痛及任何不適時，請立即通知護理師。
- 6.固定板或紙膠上有滲濕或點滴連接管有脫落時，請告知護理師為您重新檢查固定。
- 7.夜間護理師仍會定時巡視點滴，請您安心休息。
- 8.發現點滴管路有空氣氣泡，請告知護理人員來處理。
- 9.護理師將點滴流速調好，請不要自己調速度，以免影響藥物作用。
- 10.使用點滴幫浦控制滴數時，請勿自行調整機器，機器發生聲響時請立刻通知護理師。

國軍左營總醫院護理部 關心您的健康
如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機 2377