小兒燙傷的認識

一、前言:

根據衛生福利部統計,孩童死因以事故傷害居首位,其中事故傷害以燒 燙傷最為常見,1至6歲為高危險群,事故地點以家中最多,時間集中在 用餐時間。

大多數兒童的燙傷是可預防的,然而當不幸的情況發生時,我們所是要 學習的是如何將傷害的程度減至最小,面臨的處理從受傷、住院到復健 等的種種問題。

二、造成小孩燙傷的原因:

常見造成兒童燙傷的原因如洗澡水、打翻桌上的熱開水、熱湯、泡麵、燒紙、玩火柴、咬電線、瓦斯漏氣、吃火鍋、玩爆竹、烤肉、煮咖啡、泡茶、機車排氣管、電源開關、插座等。

三、燙傷之緊急處理步驟:

家中兒童燙傷時,請勿私自塗牙膏、醬油、漿糊、米酒、凡士林等各種物品,首先應保持鎮靜,遵循下列五項緊急處理步驟:

- 1. 沖:立刻以流動的冷水沖洗患處 15 至 30 分鐘,快速降低皮膚表面熱度。
- 2. 脫:在水中以剪刀小心的將患處衣物剪開,盡量避免將傷口之水泡弄破。
- 3. 泡:在冷水中持續浸泡 30 分鐘。如是化學灼傷則省略此步驟。
- 4. 蓋:使用乾淨的布巾覆蓋患部,勿任意塗抹外用藥物或民間偏方。
- 5. 送:立即送醫救治。

四、住院時期應注意事項:

1. 營養方面:

採高蛋白、高熱量飲食,如魚肉蛋、奶、豆類、花生、腰果、巧克力、布丁等,因高蛋白食物可以促進傷口的癒合。

2. 隔離方面:

燒傷中心本身為一隔離單位,為避免患孩大面積的傷口受到感染,請家屬務必遵守燒傷中心之訪客規則,勿留一人以上在燒傷中心內,每天以兩次換班為原則,減少進出的機會,且入內時,應著規定之服裝,穿隔離衣、換上拖鞋、戴帽子、口罩、觸碰患孩應先洗手,勿私自帶未經消

毒的被子進入燒傷中心內。

3. 經濟方面:

經濟有困難時,可至社會服務處或醫院社工查詢有關補助之事項。

五、出院後應注意事項:

- 1. 當患孩感到傷口癢或緊繃時,可以塗擦嬰兒油或乳液,提供涼爽之環境,洗澡水勿太熱,否則容易使皮膚發癢,使用棉質的衣服等方法來減輕搔癢感,避免小孩去抓,應以拍打方式或冰敷降低搔癢感,若以上方法無效時,則可請醫師開止癢的藥物來減輕症狀。
- 2. 傷口癒合後,在燒傷傷口及取皮處易長小水泡,勿將其弄破,若不小心 弄破時,應以乾淨的小棉棒擦拭,再蓋上已消毒的紗布即可,此種症狀 通常在六個月後消失。
- 3. 持續穿著彈性衣達二年之久,除洗澡時間及照顧傷口外,勿任意脫下, 如此可減輕疤痕之產生。
- 4. 洗澡時使用中性肥皂或經稀釋的依必朗、沙威隆等。
- 5. 出院一年至二年內,勿讓傷口直接暴露在陽光之下,以避免傷口顏色加深,可穿棉質類的衣服防曬,臉部灼傷則可戴鴨舌帽或寬邊帽防曬。
- 6. 持續住院期間護理人員所指導的復健運動,另可藉游泳來增加關節的活動度。
- 7. 定期返回門診追蹤。

六、燒傷之預防:

- 1. 阻止兒童觸碰電源開關、插座等,電器用畢後,隨手將插頭拔除。
- 2. 勿讓兒童玩弄瓦斯開關,一旦瓦斯發生漏氣現象,立即將窗戶打開通 風。
- 3. 洗澡時先放冷水,再放熱水,勿單獨留小孩於浴室內。
- 4. 勿讓小孩玩打火機、火柴,燒紙錢、烤肉時勿讓小孩單獨在旁。
- 5. 熱水瓶、熱湯及泡麵應置於遠離桌角處,若有桌巾,不宜過長,以免小孩拉扯。

國軍左營總醫院護理部關心您的健康 如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機