

微整玻尿酸

玻尿酸原本就存在體內，是支撐皮膚彈性的重要成分，但會隨著年齡而流失，導致皮膚缺水而有皺紋。此時可將玻尿酸注射到皮下，玻尿酸會與體內原有的玻尿酸成分融合，達到撫平皺紋、填補凹陷的效果。注射到體內的玻尿酸，與皮膚相容性高，可被人體分解、吸收。

玻尿酸注射能達到除皺與修飾臉部的原理，主要是玻尿酸以『填充物』的方式注入於真皮皺摺凹陷或欲豐滿之部位如嘴唇、臉頰、鼻樑、下巴、疤痕等處，所以能立即達到除皺與改變容貌的效果。

一、適用對象

靜態皺紋（如法令紋、木偶紋）、臉部凹陷（淚溝、淚溝型黑眼圈、眼窩凹陷、夫妻宮凹陷、隆鼻、蘋果肌凹陷、豐頰、嘴角下垂、唇線不明顯、山根凹陷、下巴短或下巴內縮等）、臉型不對稱、痘疤、凹疤、皺紋、墊下巴、唇紋等。

二、禁忌者

1. 孕婦、哺乳中的婦女不可注射
2. 對藥劑成份過敏者
3. 心臟病、高血壓病人
4. 蟹足腫病史
5. 嚴重糖尿病
6. 肝腎功能受損
7. 免疫系統異常或其他經醫師判斷不適合此療程者。

三、玻尿酸微整前注意事項

1. 玻尿酸療程當日請不要化妝、不要喝酒、也不要使用三溫暖。
2. 請告知醫師自己過往病例，曾進行臉部整形手術、雷射光療，或曾經施打過任何微整形項目。
3. 如有心臟病、高血壓或者對麻藥過敏有凝血性問題的，除微整形外一般動刀式的整形也不建議進行。
4. 哺乳中的婦女、對藥劑成分過敏或正在服用肌肉鬆弛症藥劑者，不建議接受療程。

5. 雖然是非侵入性的手術，但醫師的技術優劣、劑量的判斷、審美觀，也是影響術後滿意度的考量因素。

四、玻尿酸微整後注意事項

1. 玻尿酸術後 48 小時進行冰敷，減輕紅腫狀況(紅腫狀況依個人體質不同)。
2. 玻尿酸注射治療後，可能會有下列暫時性的現象產生，如瘀血、紅、疼痛、搔癢、微腫及注射部位摸到有彈性的物質存在，這些症狀都是正常的，於療程後幾天至 1~2 週後消失。
3. 術後可多進行施打部位的濕敷或者加強保濕產品護理。
4. 術後七天內避免日光浴、游泳或者去三溫暖，洗臉時務必輕柔，避免擠壓。
5. 注射山根隆鼻者，前七天儘量不要戴眼鏡。
6. 玻尿酸治療效果會因人而異，醫師會視個人需要，建議是否重新再治療。

五、玻尿酸微整療程後須知

1. 注射後 24 小時形狀固定，期間避免接觸注射區域。
2. 注射後若有紅腫可冰敷減輕症狀。
3. 術後短時間之內不要作劇烈運動。
4. 術後正常基礎保養，不要特別在治療部位按摩。
5. 術後 2 週內請勿去高溫場所，如：三溫暖、烤箱、蒸氣間。
6. 若是接受玻尿酸豐唇者，術後腫脹期會較長，一些病人會輕微腫脹至一星期。

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康

如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機